

# 巴氏腺囊腫手術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 前言

巴氏腺囊腫是因巴氏腺出口阻塞及細菌感染，所導致外陰部積膿、腫脹、疼痛和發燒等症狀。

## ■ 手術前注意事項

- 手術時間避免安排在月經期間。
- 手術當天包括開水需禁食 6~8 小時(慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用)。
- 手術期間必須有家屬陪同。

## ■ 手術過程

- 協助注射點滴，進入手術室後注射麻醉藥品—讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待麻

醉藥效消退時才返家休息。

## ■ 手術後注意事項

- 手術後 24 小時內，請勿自行開車、騎車，如需外出，務必請家人陪同，勿做重大事件之決定，如：簽支票等。
- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。
- 日常活動無限制，手術當天避免劇烈活動；減少傷口摩擦，保持傷口乾淨、乾燥，並按醫囑服藥及塗抹傷口。
- 若出血量比平常月經量多、腫脹厲害、發燒或解尿不順時，應立刻就醫。
- 手術後一週內不宜做粗重工作，採淋浴方式洗澡。
- 手術後 5-7 天應返回門診檢查。並與醫師討論何時恢復性生活。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.217.2013.12 六修