

# 無痛胃鏡大腸鏡麻醉

國泰綜合醫院 麻醉科編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 「麻」是「不痛」，而「醉」則是「無知覺」的意思。換言之，「麻醉」是一種在手術當中利用藥物使您的痛覺及(或)知覺暫時消失的醫療技術，使您在手術過程中感覺不到疼痛，同時方便於手術之進行。一般而言，臨床使用的麻醉技術大致可分為全身麻醉、區域麻醉及局部麻醉。

■ 根據美國麻醉醫學會所制定的標準我們將病患的身體狀態分為以下等級：

第一級：正常，健康(手術前後死亡率 0.06~0.08%)

第二級：有輕微的全身性疾病但無功能上的障礙  
(手術前後死亡率 0.27~0.4%)

第三級：有中度至重度的全身性疾病且造成部份的功能障礙(手術前後死亡率 1.8~4.3%)

第四級：有重度的全身性疾病，具有相當的功能障礙且時常危及生命(手術前後死亡率 7.8~23%)

第五級：瀕危狀態，不管有無手術預期在二十四小時內死亡(手術前後死亡率 9.4~51%)

## ■ 靜脈全身麻醉(Intravenous general anesthesia)

主要是經由靜脈給藥，達成病患手術中的睡眠及止痛。適用的手術基本上是以表淺部位小手術或是侵入性檢查為主。臨床上有幾項因素會增加麻醉風險，包括心血管疾病、呼吸系統疾病或其他任何慢性疾病；未空腹或隱瞞進食者，易造成吸入性肺炎。這些情況都不適用靜脈全身麻醉，所以在接受無痛鏡檢前一定要遵守前一晚禁食、禁水的要求。

本麻醉方式主要適用在較短時間的手術(如大腸鏡檢、子宮搔刮術...等)。

## ■ 靜脈全身麻醉與插管全身麻醉比較

靜脈全身麻醉和插管全身麻醉最大的不同點，在於給氧氣的方式不同。靜脈全身麻醉因病患自

主呼吸能力，所以用氧氣面罩給氧、輔助呼吸；而插管全身麻醉時病患無自主呼吸能力，必須使用氣管內管連接呼吸器來提供氧氣給病患。所以在術後恢復上，靜脈全身麻醉除了沒有因插管所造成的咽喉不適的症狀外，需要的恢復時間也比較短。

### ■ 無痛鏡檢檢查前注意事項：

- 1.前往醫院檢查務必請親友陪同，本人勿駕車或騎乘機車來院。
- 2.諮詢時請儘量告知目前身體狀況，用藥情形及特殊病史。
- 3.檢查前如發生感冒及其他身體異常狀況，請事先告知醫師。
- 4.術前請遵照醫師囑示如禁食、禁水、服藥...等。

### ■ 麻醉後常見的不適：

主要有噁心、嘔吐等。

### ■ 無痛鏡檢麻醉後注意事項：

- 1.檢查回家後先喝水，如無不適可採小量多餐進食，有噁心嘔吐情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。

2.檢查後如有腹脹情形，如廁後會改善。

3.三天內如有大出血或腹脹情形，請先到急診室看診。

4.檢查後 24 小時內宜休息半天至一天，請勿自行開車、騎車，如需外出，務必有家屬陪同，勿做重大事件之決定如：簽支票等。

5.一週後掛門診看病理化驗報告。

### ■ 息肉切除者：

檢查結束三天內，不要吃硬的食物及含纖維的食物，例如：青菜、水果、需多喝水或果汁，請過濾殘渣，以避免糞便太硬，磨擦電燒傷口，造成出血。

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121

麻醉相關疑問請洽分機 3514、6003

鏡檢相關疑問請洽分機 3120

我們將竭誠為您服務！

A6310.273.2013.12 四修

F-ANES-0040,2013/12/18 四修