

預防接種?

資料來源/小兒科

預防接種

本院新生兒住院期間依規定施打 B 型肝炎疫苗第一劑，另視需要，在出生時施打 B 型肝炎免疫球蛋白；出院後(滿月)至門診施打 B 型肝炎第二劑，其他預防接種項目及時間，請依兒童健康手冊說明，按時接種各階段疫苗，以維護寶寶的健康。

卡介苗

一、施打條件：建議接種時間為出生滿 5-8 個月，且 SCID (嚴重複合型免疫缺乏症) 報告正常。特別提醒您，於本院出院時，會協助寶寶掛號，請妥善保管掛號單。也可至衛生所或其他醫療院所施打 (各醫院施打時間不同，建議先打電話詢問)。

二、接種反應說明：注射卡介苗可以預防結核病，接種卡介苗後 10-14 天，注射部位 (左手上臂) 會呈現一小紅結節，此後漸續變大，微有痛癢但不發燒，嬰兒有時同側腋窩淋巴腺會稍腫大，此為正常反應，約四至六週會變成膿泡或潰爛，不必擦藥或包紮，洗澡時不慎碰水，以棉籤擦乾即可，平均二至三個月會癒合結痂，且會留下一個小小的疤痕。

三、有以下情形時須返診檢查

- (一) 腋窩淋巴腫大的範圍大於花生米粒時。
- (二) 接種後三個月注射部位完全沒有反應時。